

Gastroscoopie

Een gastroscoopie is een inwendig onderzoek waarbij de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm nauwkeurig op de aanwezigheid van afwijkingen wordt geïnspecteerd. Het doel van dit onderzoek is het opsporen van de oorzaak van uw klachten en eventueel het behandelen van afwijkingen.

De gastroscoopie wordt uitgevoerd met behulp van een endoscoop, een videocamera ingebouwd in een lange dunne, buigzame en bestuurbare slang die via de mond wordt ingebracht.

Het onderzoek kan onder een lichte roes (sedatie), meer informatie hierover in de OLVG-folder: Sedatie. Het is ook mogelijk alleen keelverdooving te geven.

Uw afspraak

Locatie Oost: meldt u zich bij de Endoscopie- en Behandelafdeling

Locatie West: meldt u zich bij de afdeling Endoscopie, route 16

Medicijnen voor het onderzoek

- Gebruikt u medicijnen, met name bloedverdunners, overleg dan ruim van tevoren met uw arts of u hiermee door moet gaan.
- Als u insuline gebruikt, neemt u dan uw bloedsuikermeter en de insuline mee naar het ziekenhuis. Meer informatie kunt u lezen in de OLVG-folder: 'Voorbereiding op behandeling voor diabetespatiënten'
- Neem uw actueel medicatie-overzicht mee (gratis via uw apotheek)

Vorbereiding

U moet voor het onderzoek nuchter zijn. De slokdarm, maag en twaalfvingerige darm kunnen alleen worden bekeken als ze leeg zijn.

• Heeft u een afspraak vóór 12.00 uur?

Dan mag u na middernacht niet meer eten en roken. Tot 2 uur voor het onderzoek mag u helder vloeibaar drinken, zoals water, helder vruchtensap, thee of koffie (zonder melk). 2 uur voor het onderzoek mag u ook niet meer drinken.

• Heeft u een afspraak na 12.00 uur?

Dan mag u vóór 7 uur 's ochtends nog een licht ontbijt nemen, zoals 1 kopje thee met een beschuitje met jam. Na 7 uur in de ochtend stopt u met eten en roken. Tot 2 uur voor het onderzoek mag u helder vloeibaar drinken, zoals water, helder vruchtensap, thee of koffie (zonder melk).

Medicijnen

U mag in principe op de dag van het onderzoek uw medicijnen innemen met een slokje water. Stop nooit op eigen initiatief met uw medicatie, overleg hierover altijd met uw arts.

Het onderzoek

- De gastroscopie wordt gedaan door een arts en endoscopieverpleegkundigen.
- Voordat het onderzoek begint, krijgt u een drankje dat schuimvorming in de maag tegengaat. Een eventuele gebitsprothese of piercing in de tong moet u uitdoen. Tussen uw kaken wordt ter bescherming van uw tanden en de endoscoop een plastic ring geplaatst.
- Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij op het bed. De arts schuift de endoscoop in de mond tot aan de twaalfvingerige darm. Dit kan een vervelend gevoel zijn, maar het is niet pijnlijk. Bij het inbrengen van de endoscoop en de rest van het onderzoek blijft er genoeg ruimte over in de keelholte om normaal te kunnen ademen.
- Via de endoscoop wordt lucht ingeblazen om de binnenkant van de maag beter zichtbaar te maken. Het kan zijn dat u hierdoor moet boeren.
- De arts kan, als dat nodig is, met een klein tangetje wat weefsel van de binnenkant van de maag wegnemen voor onderzoek. Dit heet een biopsie. U voelt hier niets van. Het weefsel wordt onderzocht onder de microscoop.

Na het onderzoek

- Als u keelverdooving krijgt is deze na ongeveer een half uur uitgewerkt. Neem eerst een slokje water. Gaat het slikken goed en u verslikt zich niet, dan kunt u weer normaal eten en drinken.
- Uw keel kan nog pijnlijk aanvoelen. Thee met een beetje honing helpt de keel te verzachten
- Het kan zijn dat u nog een opgeblazen gevoel heeft. Door winden en boeren te laten verdwijnt dit.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten

De uitslag

U ontvangt na het onderzoek de voorlopige uitslag van het onderzoek. De definitieve uitslag krijgt u na 2 weken van uw huisarts of behandelend arts. De uitslag van eventueel weefselonderzoek is na ongeveer 7 werkdagen bekend.

Kans op complicaties

Complicaties komen zelden voor. De meest voorkomende complicatie is een bloeding. Een andere complicatie is een perforatie, dit is een scheurtje of gaatje in de slokdarmwand.

Mocht u toch pijn hebben of zich niet lekker voelen, geef dit dan door aan de verpleegkundige en/of arts. Als u thuis hevige buikpijn, koorts of bloedverlies krijgt, bel dan met het ziekenhuis.

Naar huis

- U kunt na het onderzoek direct weer naar huis.
- Als u sedatie tijdens de gastroscopie heeft gehad, mag u na ongeveer 1 uur op de uitslaapkamer, onder begeleiding naar huis. Meer informatie hierover in de folder 'Sedatie tijdens endoscopie'.
- U mag weer gewoon eten en drinken. Tenzij u een andere instructie van de arts of verpleegkundige krijgt

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online: www.olvg.nl/mdl

Contact

Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost

T 020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

afdeling Endoscopie, locatie West

T 020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

Route 16

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost

T 020 599 30 16 (dag en nacht bereikbaar)

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West

T 020 510 81 61 (dag en nacht bereikbaar)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 11 januari 2024, foldernr.3300