

Sedatie

onderzoek terwijl u licht slaapt

Sedatie is een lichte slaap (roes), waardoor u minder van het onderzoek merkt. Als u ontspannen bent verloopt het onderzoek in het algemeen makkelijker. Sedatie is mogelijk bij diverse onderzoeken van Maag-, Darm- en Leverziekten.

- Hieronder leest u wat u kunt verwachten en waar u rekening mee moet houden.
- In de informatiefolder van het onderzoek leest u wat u moet doen ter voorbereiding. Bijvoorbeeld of u wel of niet mag eten voor het onderzoek.

Zonder de juiste voorbereiding kan het onderzoek niet doorgaan.

Regel begeleiding

We kunnen u alleen sedatie geven als u na het onderzoek onder begeleiding vanaf de afdeling naar huis kunt. Zorg daarom dat wij iemand kunnen bellen om u na het onderzoek te komen ophalen.

Vóór het onderzoek

De verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte en controleert samen met u uw gegevens. Uw bloeddruk, hartslag, en zuurstofgehalte wordt gemeten en u krijgt een infuusnaald in uw arm.

Tijdens het onderzoek

- Ook op de onderzoekskamer meten we uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte.
- U krijgt extra zuurstof via uw neus toegediend.
- De arts geeft door het infuus een medicijn waardoor u zich snel ontspannen en slaperig voelt (Dormicum, Midazolam©).
- Ook kan door het infuus een medicijn gegeven worden wat de pijn vermindert (Alfentanil, Rapifen©).
- De keuze en hoeveelheid van de toegediende medicijnen is afhankelijk van het soort onderzoek, het effect dat de medicijnen bij u hebben en uw medische voorgeschiedenis.
- U bent tijdens het onderzoek niet volledig buiten bewustzijn.

Na het onderzoek

Het roesje werkt meestal langer dan de duur van het onderzoek. Daarom brengen we u na het onderzoek naar de uitslaapruijnte. Hier kunt u herstellen.

U blijft ongeveer één uur onder controle. Daarna verwijjert de verpleegkundige het infuus en gaat u met uw begeleider weer naar huis. U kunt gewoon eten tenzij er iets anders met u is afgesproken.

Nadelen en risico's

- Het gebruik van dormicum (Midazolam©) heeft voor u gevolgen:
 - Tot 12 uur na de sedatie mag u niet deelnemen aan het verkeer.
 - Het is verstandig om deze dag geen belangrijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld een beslissing over een financiële transactie.
- Heel soms kunnen problemen met de ademhaling of de hartfunctie ontstaan. Deze kunnen meestal goed behandeld worden met medicijnen. Als u thuis ernstige klachten krijgt, bel dan met het ziekenhuis.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Contact

Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost

T 020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

afdeling Endoscopie, locatie West

T 020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

Route 16

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost

T 020 599 30 16 (alleen buiten kantoorjiden)

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West

T 020 510 81 61 (dag en nacht bereikbaar)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 11 januari 2024, foldernr.3425