

Peri-anaal abces

U heeft met uw arts gesproken over de operatie aan een peri-anaal abces. Wat is een peri-anaal abces? En wat gebeurt er tijdens de operatie? Dat en meer leest u in deze folder.

Wat is een peri-anaal abces?

Een peri-anaal abces is een ontstoken slijmklief bij de anus. De verdikking ontstaat door een holte met pus. Het is vaak pijnlijk, warm en rood. Door de pijn kunt u niet meer rechtop zitten.

De behandeling

Een peri-anaal abces kan alleen worden verwijderd door een operatie.

De operatie

Onder anesthesie maakt de chirurg het abces open en spoelt de holte schoon. Soms krijgt u een klein slangetje (drain) of een verbandgaas in de wond om de wond open te houden. Op deze manier kan alle pus de wond uit. Ook kan de wond dan goed schoongespoeld worden en ontstaat er niet opnieuw een abces.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de Recovery (uitslaapkamer). Wanneer u goed bijgekomen bent van de operatie mag u terug naar de verpleegafdeling. Hier mag u weer eten en drinken.

Pijn

U mag op de wond zitten, maar het is beter om op uw zij te liggen. Het is belangrijk om aan te geven hoeveel pijn u heeft.

Hoe verzorgt u de wond?

De verpleegkundige leert u een dag na de operatie uw wond verzorgen:

- Het is belangrijk de wond open te houden. Daarom moet u de wond 3 keer per dag spoelen. Dit kunt u doen onder de douche. U spoelt de wond gedurende 2 minuten schoon. U spoelt de wond ook, nadat u ontlasting heeft gehad.
- U dekt de wond af met een schoon verbandgaas of maandverband.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig zoals trombose, blaasontsteking, longontsteking, nabloeding, wondinfectie.

- Soms blijft er toch pus achter in de wond, waardoor een nieuw abces kan ontstaan.

- Soms ontstaat er een bloeditstorting die de huid rondom het litteken rood of blauw verkleurt. Deze bloeditstorting kan langzamerhand naar beneden zakken. Dit kan geen kwaad en verdwijnt geleidelijk weer.

Als er complicaties zijn, neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Chirurgie. Buiten kantooruren kunt u bellen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Naar huis

- U mag in principe dezelfde dag nog naar huis. U krijgt binnen 2 weken een afspraak bij de polikliniek.
- Spoel de wond 3 keer per dag tot uw afspraak op de polikliniek. De arts bekijkt de wond en vertelt wat u verder moet doen.
- Zolang de wond open is, mag u niet zwemmen of in bad.
- U kunt eventueel paracetamol innemen tegen de pijn. Deze kunt u kopen bij de drogist. U mag maximaal 8 tabletten paracetamol 500 mg per dag innemen.
- Als de pijn het toelaat, doet u zo veel mogelijk zelf. Wanneer u zich goed genoeg voelt om te werken, kan dit.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota. Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online

- www.olvg.nl/chirurgie

Contact

polikliniek Chirurgie, locatie Oost

T 020 599 30 58 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

E chirurgie@olvg.nl

P3

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost

T 020 599 30 16 (dag en nacht bereikbaar)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 20 oktober 2021, foldernr.0479