

Huidallergietest KNO

Bij dit onderzoek controleren we of u allergisch bent voor bepaalde stoffen.

Uw afspraak

U heeft een afspraak voor het onderzoek op

Datum _____ **om** _____ **uur**

- Locatie Oost, polikliniek KNO, P4
- Locatie West, polikliniek KNO , route 12

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt gemiddeld 35 minuten.

Voor het onderzoek

Eten en drinken

Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.

Medicijngebruik

Bepaalde medicijnen kunnen een huidpriktest verstoren. Overleg altijd met uw arts of u kunt stoppen met de medicijnen !

- Antihistaminica (anti-allergiemedicatie) 3 dagen voor het onderzoek niet meer gebruiken
- Op de dag van het onderzoek mag u geen bodylotion en crèmes gebruiken op de Huid van uw onderarmen.

1. Tabletten tegen allergie (antihistaminica) 3 dagen voor het onderzoek stoppen

Acrivastine	Cyproheptadine	Kestine	Semprex
Aerius	Desloraditine	Ketotifen	Tavegil
Alimemazine	Dexchlorfeniramine	Levocetirizine	Telfast
Allerfree	Dimetindeen	Loratidine	Terfenadine
Atarax	Ebastine	Mebhydroline	Tinset
Cetirizine	Fenistil	Mizolastine	Triludan
Claritine	Fexofenadine	Mizollen	Xyzal
Clemastine	Hydroxizine	Navicalm	Zyrtec

2. Neussprays, waaronder Dymista, hoeven niet voor het afnemen van de huidpriktest gestaakt te worden.
3. **Orale corticosteroïden** in een dosering van 10 mg per dag of lager beïnvloeden de huidpriktest in het algemeen niet; dit geldt ook voor een kortdurende hoge dosis (stootkuur).
4. **Corticosteroïdzalven** (hormoon bevattende zalven): 7 dagen voor de huidpriktest niet meer op de onderarm smeren. Indien patiënt de zalf op één arm smeert kan de andere arm gebruikt worden voor de huidpriktest.
5. **Astemizol** (Hismanal): 6 weken voor de huidpriktest staken

Het onderzoek

U krijgt op uw onderarm druppeltjes. Ieder druppeltje bevat een stof waarvoor u allergisch zou kunnen zijn. Met een heel klein prikkertje wordt een klein prikje in de huid gegeven, door de druppel heen. Als u allergisch bent, krijgt u een reactie die lijkt op een muggenbult en kan jeuken. Deze reactie verdwijnt vanzelf weer. Nadat de prikken gegeven zijn, moet u 30 minuten wachten in de wachtkamer. Na dertig minuten wordt de uitslag afgelezen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt door een specialist beoordeeld. Met uw behandelende arts heeft u vóór het onderzoek afgesproken waar en wanneer u de uitslag te horen krijgt. De analist(e) kan u daarover geen mededelingen doen.

Naar huis

Na het onderzoek mag u naar huis. Gebruik van eigen of openbaar vervoer is geen probleem.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota. Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online

- www.olvg.nl/kno

Contact

polikliniek Keel-, Neus- en Oorheeskunde (KNO), locatie Oost

T 020 599 30 40 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

E kno@olvg.nl

P4

polikliniek Keel-, Neus- en Oorheeskunde (KNO), locatie West

T 020 510 88 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

E kno@olvg.nl

Route 12

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 22 september 2021, foldernr.2361