

Enteroscopie

Een enteroscopie is een inwendig onderzoek van de dunne darm. Het doel van dit onderzoek is het opsporen van de oorzaak van uw klachten en eventueel het behandelen van afwijkingen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een endoscoop. Dit is een videocamera die is ingebouwd in een lange, dunne, buigzame en bestuurbare slang. De arts brengt de endoscoop via de mond, anus of stoma in.

We brengen u bij dit onderzoek in een diepe slaap. Meer informatie leest u in de folder [Sedatie met Propofol bij onderzoek of behandeling](#).

Het onderzoek begint met een uitgebreide voorbereiding. Hieronder volgen de instructies. Zonder deze voorbereiding kan het onderzoek niet doorgaan.

Uw afspraak

Meldt u zich bij de Endoscopie- en Behandelafdeling, locatie Oost

Medicijnen voor het onderzoek

- Gebruikt u medicijnen, met name bloedverdunners, overleg dan ruim van tevoren met uw arts of u hiermee door moet gaan.
- IJzertabletten moeten één week voor het onderzoek worden gestopt.
- Als u insuline gebruikt, neem dan uw bloedsuikermeter en de insuline mee naar het ziekenhuis.
- Neem uw actueel medicatie-overzicht mee (gratis via uw apotheek)

Vorbereiding

Om de darm goed te kunnen bekijken, is het belangrijk dat deze volledig schoon is, dat wil zeggen dat alle ontlasting er uit moet zijn. Daarom heeft u een recept voor laxeermiddel(en) gekregen:

- Moviprep®
- 2 Bisacodyl® tabletten (alleen als het vakje is aangevinkt)

Wij adviseren u een week van tevoren de laxeermiddel(en) op te halen bij uw apotheek.

Vanaf twee dagen voor het onderzoek:

- Eet alleen lichte maaltijden: brood (zonder zaden) met boter/margarine/halvarine, kaas, magere vleeswaren, gekookt ei, stroop, honing, jam (zonder pitjes), heldere soep, gekookte aardappelen, rijst, runder- of kalfsgehakt, vis, kip- of kalkoenfilet, gekookte wortel of bloemkool, appelmoes, yoghurt, vla. U mag wel alles drinken.
- Wanneer Bisacodyl is voorgeschreven dan neemt u om 22.00 uur de 2 tabletten Bisacodyl in, zodat de volgende morgen de ontlasting plaatsvindt. U kunt hierdoor kramp in uw buik ervaren.

De avond vóór het onderzoek:

- Neem tussen 17.00 - 18.00 uur een kleine vloeibare maaltijd, bijvoorbeeld: yoghurt, vla, soep zonder vulling.
- Drink tussen 19.00 - 20.00u uur 1 liter Moviprep®
- Drink daarna ten minste 1 liter heldere drank (water, thee, limonade, heldere bouillon)
- U mag niets meer eten nadat u met het drinken van Moviprep® bent begonnen.
- U mag wél onbeperkt heldere dranken nemen.

De dag van het onderzoek:

- Begin 4 uur vóór uw afspraaktijd met het opdrinken van 1 liter Moviprep® volgens onderstaand schema

Drink ook tenminste 1 liter heldere drank.....

Tijdstip opdrinken Moviprep®

.....Tijdstip afspraak

8.30 uur	4.30 - 5.30 uur
9.00 uur	5.00 - 6.00 uur
9.30 uur	5.30 - 6.30 uur
10.00 uur	6.00 - 7.00 uur
10.30 uur	6.30 - 7.30 uur
11.00 uur	7.00 - 8.00 uur
11.30 uur	7.30 - 8.30 uur
12.00 uur	8.00 - 9.00 uur
13.00 uur	9.00 - 10.00 uur
13.30 uur	9.30 - 10.30 uur
14.00 uur	10.00 - 11.00 uur
14.30 uur	10.30 - 11.30 uur
15.00 uur	11.00 - 12.00 uur
15.30 uur	11.30 - 12.30 uur
16.00 uur	12.00 - 13.00 uur

Blijft er ontlasting komen, blijf dan doorgaan met drinken tot 2 uur voor de afspraak totdat er alleen nog helder, lichtgeel, vocht komt.

Tips:

- Voor de smaak kunt u wat limonadesiroop aan de Moviprep® toevoegen.
- Probeer in beweging te blijven, en in de buurt van het toilet.
- Neem extra ondergoed mee naar het ziekenhuis.

U mag op de dag van het onderzoek uw medicijnen innemen met een slokje water. Stop nooit op eigen initiatief met uw medicatie, overleg hierover altijd met uw arts.

Het onderzoek

- De enteroscopie wordt uitgevoerd door een maag-darm-leverarts samen met een endoscopieverpleegkundige. Ook is er een anesthesiemedewerker aanwezig.
- Via een infuusnaald in uw arm krijgt u een slaapmiddel toegediend.
- U gaat op de onderzoekstafel op uw linkerzij liggen. Dan controleren we de hartslag en het zuurstofgehalte met een knijpertje aan de vinger.
- Tijdens het onderzoek wordt lucht in de maag of de darmen geblazen, hierdoor kunt u een drukkend, pijnlijk of krampend gevoel in de buik krijgen. Dit verdwijnt door boeren en/of winden te laten.
- Soms is het nodig van houding te veranderen of, in verband met bochten in de darm, op uw buik te duwen.
- De arts kan, als dat nodig is, met een klein tangetje wat weefsel van de binnenkant van de darm wegnemen voor onderzoek. Dit heet een biopsie. U voelt hier niets van. Het weefsel wordt onderzocht onder de microscoop.

Duur van het onderzoek

- Het onderzoek zelf duurt ongeveer een uur en een kwartier. Hierna blijft u ongeveer een uur uitslapen.
- De voorbereiding start twee dagen vóór het onderzoek.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer gebracht.
- Het kan zijn dat u nog een opgeblazen gevoel heeft. Door winden te laten verdwijnt dit.
- Als er weefsel is weggenomen, kan er wat bloed bij de ontlasting zitten.

De uitslag

U ontvangt na het onderzoek de voorlopige uitslag van het onderzoek. De definitieve uitslag krijgt u na 2 weken van uw huisarts of behandelend arts. De uitslag van eventueel weefselonderzoek is na ongeveer 7 werkdagen bekend.

Kans op complicaties

Complicaties komen zelden voor. Mocht u toch pijn hebben of zich niet lekker voelen, geef dit dan door aan de verpleegkundige en/of arts. Als u thuis hevige buikpijn, koorts of bloedverlies krijgt, bel dan met het ziekenhuis.

Naar huis

- Na sedatie met Propofol mag u, na ongeveer één uur op de uitslaapkamer, onder begeleiding naar huis. Meer informatie hierover in de folder ‘Sedatie met Propofol bij onderzoek of behandeling’.
- U mag weer gewoon eten en drinken.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Contact

Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost

T 020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost

T 020 599 30 16 (dag en nacht bereikbaar)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 25 november 2021, foldernr.3444